



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú. Decana de América

Facultad de Medicina

Unidad de Posgrado

Programa de Segunda Especialización en Medicina Humana

**“Características clínico-histopatológicas del carcinoma
basocelular en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza,
año 2007 - 2008”**

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Para optar el Título de Especialista en Dermatología

AUTOR

Ana Matilde RODRÍGUEZ GUZMÁN

ASESOR

Dra. Gladys VIDARTE ORREGO

Lima, Perú

2013

Resumen

“Características clínico-histopatológicas del Carcinoma basocelular en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza: Año 2007-2008.”

Autor: Ana Matilde Rodriguez Guzmán

Asesora: Dra. Gladys Vidarte Orrego-Médico Dermatólogo HNAL.

Objetivos: Conocer la frecuencia y características clínicas del Carcinoma basocelular (CBC) en la población atendida en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza en el período entre Enero del 2007 a Diciembre del 2008.

Material y métodos: Estudio retrospectivo, observacional, analítico y descriptivo, realizado en 125 pacientes con diagnóstico de CBC y confirmado histopatológicamente en el período 2007-2008.

Resultados: La edad promedio fue de 62.6 ± 10.2 años con mayor frecuencia de pacientes con edad > 60 años (79.20%) y predominancia femenina (64%). El diagnóstico clínico previo más frecuente fue el CBC de tipo ulceroso (55.20%) y el pigmentado (21.60%). La localización de la lesión más frecuente fue en las diversas áreas de la cabeza (94.40%), específicamente en la pirámide nasal (28.80%) y en la mejilla (26.40%). El tamaño de la lesión más frecuente fue entre 6-10 mm (56%), menor de 6 mm (22.40%), mayor de 10 mm a 40 mm (21.60%). El tiempo de evolución fue mayor entre 9-12 meses (30.40%), mayor de 24 meses (26.40%), 13-24 meses (22.40%), 1-8 meses (20.80%). El tumor fue primario en 109 casos (87.20%) y se observó recidiva en 16 pacientes (12.80%). El diagnóstico histopatológico más frecuente fue el CBC tipo sólido en 39.2%, pigmentado 20.8%, sólido adenoide 13.6%, quístico 12.0%, adenoide 7.2%, superficial 6.4%, metatípico 0.8%.

Conclusiones: El CBC se encontró con mayor frecuencia en pacientes mayores de 60 años, con predominio hacia el sexo femenino. La localización más frecuente fue en la cara a nivel de pirámide nasal y mejilla. En este grupo de estudio, se pudo corroborar la

importancia de la radiación solar como un factor de riesgo e inductor de CBC. La identificación temprana en personas con mayor riesgo de desarrollo de esta patología cancerosa, nos proporcionará la posibilidad de un tratamiento eficaz que permitirá evitar las complicaciones funcionales y estéticas, ya que el crecimiento lento de la lesión nos brinda esa posibilidad.

Palabras clave: Carcinoma basocelular, Frecuencia, cáncer de piel.